

BAĞ UYUZU

Eriophyes vitis

MANİSA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
BİTKİ KORUMA ŞB. MD.

İbrahim DEMRAN

Köksal AKSU

Didem SAYMAN

BAĞ UYUZU

Eriophyes vitis

- Bağ alanlarının tümünde görülür.
- Asma yapraklarının alt yüzünden emerek yaprağın üst yüzüne doğru kabartılar oluşturur.



BAĞ UYUZU

Eriophyes vitis

- Yapraklardaki beslenme ilkbaharda gözler açılırken başlar, sonbahara kadar devam eder.
- Beslendiği alan önceleri grimsi renktedir sonraları bu renk kahverengiye döner.



BAĞ UYUZU

Eriophyes vitis

- Zararlı, çıplak gözle görülmez yılda 7-8 döl verir.
- Yoğunluk fazla olduğunda yaprağın üst kısmında ve salkımlarda da görülebilir.



BAĞ UYUZU

Eriophyes vitis

- Külleme hastalığına karşı WP yada toz kükürt kullanıldığında zararlıya karşı ayrıca bir ilaçlamaya gerek kalmaz.
- Kükürt kullanılmadığı durumlarda ilkbaharda yapılan gözlemler sonucu yapraklarda zarar belirtileri saptandığında ilaçlama yapılmalıdır.

BAĞ UYUZU

Eriophyes vitis

- *Ekonomik Zarar Eşiği:*
- **20-25 asmada ilk zarar belirtileridir.**



BAĞ UYUZU

Eriophyes vitis

